

はり師、きゅう師 国家試験問題解答集  
〔平成 28 年（2016 年）度用 第 13 回～第 23 回（2005 年～2015 年）〕

〔正誤表〕

2016・3・31

ページ	問題	誤	正
46	82	…作業環境管理に当てはまる。	…作業管理に当てはまる。
88	167	× 2 - 仙腸関節は仙骨と腸骨との耳上面の…	× 2 - 仙腸関節は仙骨と腸骨との耳状面の…
89	172	× 2 - …口頭蓋をつくる。	× 2 - …喉頭蓋をつくる。
91	179	…模様体筋が弛緩すると…	…毛様体筋が弛緩すると…
267	86	…可能な運動は手節の伸展である。	…可能な運動は手関節の伸展である。
267	87	2. 進行性筋ジストロフィー型 ②単麻痺は一則の…	2. 進行性筋ジストロフィー症 ②単麻痺は一側の…
268	87	④片麻痺は一則の…	④片麻痺は一側の…
269	90	…低出力レーザーによる温熱療法やベグボード…	…低出力レーザーによる温熱療法やベグボード…
305	149	※太陽病は「腹満して吐し、…	※太陰病は「腹満して吐し、…
336	131	…たとえば手の大陰肺経は肺に属し、…	…たとえば手の太陰肺経は肺に属し、…
365	108	○ 4 - IV 群線維は C 線維で主だるい…	○ 4 - IV 群線維は C 線維で重だるい…
387	98	× 1 - イオンチャネルは細胞膜にあるイオンを透過させる蛋白質である。 … ○ 3 - 温熱刺激は腹側脊髓視床路を上行する。	○ 1 - 温熱刺激は、ニューロン（自由神経終末）の膜の一部に活動電位が発生することで伝わる。活動電位は、イオンチャネルが開き Na イオンが細胞内に流入することで発生する。 … × 3 - 温熱刺激は外側脊髓視床路を上行する。腹側脊髓視床路は触・圧覚が上行する。
446	211	…下肢のだるさが常にある。…	…下腿のだるさが常にある。…
450	221	…近位にて分離すべり症と診断された。…	…近医にて分離すべり症と診断された。…
450	223	…消渴善飢とは消渴病の症状の一つで、…	…消穀善飢とは消渴病の症状の一つで、…
453	232 上の問題	…1 か月前から右足の冷たさと…	…1 か月前から右足の冷えと…
454	233	○ 3 - 太溪（腎経）は外果とアキレス腱の間にある。…	○ 3 - 太溪（腎経）は内果とアキレス腱の間にある。…